

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Глобальная статистика по ВИЧ

- Общее мировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2022 г. составило 39 млн [33,1–45,7 млн] человек.
 - Число новых случаев инфицирования ВИЧ в 2022 г. составило 1,3 млн [1–1,7 млн] человек.
 - Число людей, умерших от связанных со СПИДом болезней в 2022 г., составило 630 000 [480 000–880 000] человек.
 - 29,8 млн человек получали антиретровирусную терапию в 2022 г.
 - 85,6 млн [64,8–113 млн] человек инфицировались ВИЧ, а 40,4 млн [32,9–51,3 млн] человек умерло от связанных со СПИДом болезней с начала эпидемии.
-

Люди, живущие с ВИЧ

- В 2022 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 39 млн [33,1–45,7 млн] человек.
 - 37,5 млн [31,8–43,6 млн] взрослых (15 лет и старше).
 - 1,5 млн [1,2–2,1 миллиона] детей (в возрасте 0–14 лет).
 - Женщины и девочки составляли 53% всех людей, живущих с ВИЧ.
 - В 2022 году 86% [73–98%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
-

Люди, живущие с ВИЧ и получающие антиретровирусную терапию

- В конце декабря 2022 года 29,8 млн человек (76% [65–89%] всех людей, живущих с ВИЧ) получали антиретровирусную терапию, что значительно больше показателя 7,7 млн в 2010 году.
 - 77% [65–90%] взрослых в возрасте 15 лет и старше и только 57% [44–78%] детей в возрасте 0–14 лет имели доступ к лечению.

- 82% [69–95%] взрослых женщин в возрасте 15 лет и старше имели доступ к лечению, при этом такой доступ был только у 72% [60–84%] взрослых мужчин в возрасте 15 лет и старше.
- 82% [64–98%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду в 2022 году.
- В 2022 году 9,2 млн людей, живущих с ВИЧ, не имели доступа к антиретровирусной терапии.

Новые случаи инфицирования ВИЧ

- Число новых случаев инфицирования ВИЧ сократилось на 59% по сравнению с 1995 годом, когда этот показатель достиг пикового значения.
 - В 2022 году число новых случаев ВИЧ-инфекции составило около 1,3 млн [1–1,7 млн] человек, по сравнению с 3,2 млн [2,5–4,3 млн] человек в 1995 году.
 - Женщины и девочки составляли 46% новых случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году.
 - В 2022 году показатель новых случаев ВИЧ-инфекции снизился на 38% относительно 2010 года, с 2,1 млн [1,6–2,8 млн] до 1,3 млн [1–1,7 млн].
 - В 2022 году показатель новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей снизился на 58% относительно 2010 года, с 310 000 [210 000–490 000] до 130 000 [90 000–210 000].
-

Смертность вследствие СПИДа

- Число людей, умерших вследствие связанных со СПИДом болезней, снизилось на 69% относительно пикового показателя 2004 года и на 51% относительно показателя 2010 года.
 - В 2022 году общемировое число умерших от связанных со СПИДом болезней составило 630 000 [480 000–880 000] человек. Для сравнения этот показатель составлял 2,0 млн [1,5–2,8 млн] человек в 2004 году и 1,3 млн [970 000–1,8 млн] человек в 2010 году.
 - Уровень смертности, связанной со СПИДом, с 2010 года снизился на 55% среди женщин и девочек и на 47% среди мужчин и мальчиков.
-

Женщины и девочки

- В 2022 году 46% всех новых случаев заражения ВИЧ во всем мире приходилось на женщин и девочек.
- В 2022 году в странах Африки к югу от Сахары на девочек-подростков и молодых женщин приходилось более 77% новых случаев инфицирования среди молодых людей в возрасте 15-24 лет.
- В 2022 году в странах Африки к югу от Сахары вероятность инфицирования ВИЧ у девочек-подростков и молодых женщин (в возрасте 15-24 лет) была более чем в три раза выше, чем у юношей и мужчин.
- Ежедневно в 2022 году 4000 девочек-подростков и молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет по всему миру заражались ВИЧ, при этом 3100 таких случаев имели место в странах Африки к югу от Сахары.
- В 2021 году только у около 42% районов с высокой заболеваемостью ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары были специальные программы профилактики ВИЧ для девочек-подростков и молодых женщин.

Ключевые группы населения

- Во всем мире среди взрослых людей (в возрасте от 15 до 49 лет) медианная распространенность ВИЧ составляла 0,7%. Однако среди ключевых групп риска медианная распространенность была выше:
 - 2,5% среди работников секс-бизнеса
 - 7,5% среди мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами
 - 5,0% среди людей, употребляющих инъекционные наркотики
 - 10,3% среди трансгендерных лиц
 - 1,4% среди заключенных
-

Цели тестирования и лечения (95-95-95)

- В 2022 году 86% [73–98%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. Среди людей, знающих свой статус, 89% [75–98%] имели доступ к лечению. И у 93% [79–98%] людей, получающих терапию, была достигнута подавленная вирусная нагрузка.
 - В 2022 году из всех людей, живущих с ВИЧ, 86% [73–98%] знали свой статус, 76% [65–89%] имели доступ к лечению и 71% [60–83%] достигли подавленной вирусной нагрузки.
 - Пять стран — Ботсвана, Эсватини, Руанда, Танзания и Зимбабве — уже достигли целей 95–95–95 к 2022 году.
-

Финансирование

- В 2022 году на программы противодействия ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода было выделено 20,8 млрд долларов США (в постоянных ценах, выраженных в долларах США, по состоянию на 2019 год), что меньше на 2,6%, чем в 2021 году, и значительно меньше показателя в 29,3 млрд долларов США, которого необходимо достичь к 2025 году.
- Около 60% ресурсов, доступных в 2022 году, были получены из внутригосударственных источников, по сравнению с около 50% в 2010 году.
- Сокращение ресурсов, доступных для противодействия ВИЧ в 2022 году, обусловлено сокращением как международного, так и внутригосударственного финансирования. Внешнее финансирование в области ВИЧ в 2022 году составило 8,3 млрд долларов США, что меньше на 3% по сравнению с 2021 годом. Одновременно с этим снижается и внутреннее финансирование.

- Двустороннее финансирование правительством США составляло 58% всей международной помощи в противодействии ВИЧ, в то время как выплаты из Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией составляли около 29%. Оставшуюся часть внесли другие международные спонсоры, но эта доля значительно снизилась с приблизительно 3 млрд долларов США в 2010 году до 1,2 млрд долларов США в 2022 году — на 61%.
- По оценкам, в 2022 году дефицит финансирования программ профилактики ВИЧ для представителей ключевых групп населения составил 90% по сравнению с объемом финансирования, которого необходимо достичь к 2025 году.

Глобальные данные по ВИЧ

	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2021 г.	2022 г.
Люди, живущие с ВИЧ	26,6 млн [22,6–31,2 млн]	28,9 млн [24,5–33,8 млн]	31,5 млн [26,7–36,8 млн]	38,7 млн [32,8–45,2 млн]	39,0 млн [33,1–45,7 млн]
Новые случаи инфицирования ВИЧ	2,8 млн [2,2–3,8 млн]	2,5 млн [1,9–3,3 млн]	2,1 млн [1,6–2,8 млн]	1,4 млн [1,1–1,8 млн]	1,3 млн [1,0–1,7 млн]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (взрослые в возрасте 15+ лет)	2,3 млн [1,7–3,1 млн]	2,0 млн [1,5–2,6 млн]	1,8 млн [1,4–2,4 млн]	1,3 млн [950 000–1,7 млн]	1,2 млн [900 000–1,6 млн]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (дети в возрасте 0–14 лет)	530 000 [360 000–830 000]	480 000 [330 000–750 000]	310 000 [210 000–490 000]	140 000 [96 000–220 000]	130 000 [90 000–210 000]
Смертность вследствие СПИДа	1,7 млн [1,3–2,4 млн]	2,0 млн [1,5–2,7 млн]	1,3 млн [970 000–1,8 млн]	660 000 [500 000–920 000]	630 000 [480 000–880 000]

Источник: Эпидемиологические оценочные данные ЮНЭЙДС 2023 г.

Региональные данные за 2022 г.

	Люди, живущие с ВИЧ	Новые случаи инфицирования ВИЧ	Новые случаи инфицирования ВИЧ (взрослые в возрасте 15+ лет)	Новые случаи инфицирования ВИЧ (дети в возрасте 0–14 лет)	Смертность вследствие СПИДа
Общемировые показатели	39,0 млн [33,1–45,7 млн]	1,3 млн [1,0–1,7 млн]	1,2 млн [900 000–1,6 млн]	130 000 [90 000–210 000]	630 000 [480 000–880 000]
Азиатско-Тихоокеанский регион	6,5 млн [5,3–7,8 млн]	300 000 [220 000–400 000]	290 000 [210 000–380 000]	12 000 [8600–18 000]	150 000 [110 000–220 000]
Карибский регион	330 000 [290 000–380 000]	16 000 [11 000–21 000]	14 000 [10 000–19 000]	1500 [1100–2100]	5600 [4100–7500]
Восточная и Южная Африка	20,8 млн [17,4–24,5 млн]	500 000 [370 000–670 000]	440 000 [330 000–590 000]	58 000 [38 000–100 000]	260 000 [200 000–370 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	2,0 млн [1,8–2,1 млн]	160 000 [140 000–180 000]	160 000 [130 000–180 000]	... [... – ...]	48 000 [38 000–58 000]
Латинская Америка	2,2 млн [2,0–2,5 млн]	110 000 [94 000–130 000]	110 000 [90 000–130 000]	3800 [2900–4700]	27 000 [21 000–35 000]
Ближний Восток и Северная Африка	190 000 [160 000–220 000]	17 000 [13 000–23 000]	16 000 [12 000–21 000]	1700 [1300–2100]	5300 [4000–7100]
Западная и Центральная Африка	4,8 млн [4,2–5,5 млн]	160 000 [110 000–250 000]	110 000 [66 000–190 000]	51 000 [34 000–69 000]	120 000 [96 000–160 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2,3 млн [1,9–2,6 млн]	58 000 [46 000–69 000]	57 000 [46 000–69 000]	... [... – ...]	13 000 [9300–17 000]

Источник: Эпидемиологические оценочные данные ЮНЭЙДС 2023 г.

Региональная антиретровирусная терапия в 2022 году

	% взрослых (старше 15 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	% детей (в возрасте 0–14 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	% всех людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию
Общемировые показатели	77% [65–90]	57% [44–78]	76% [65–89]
Азиатско-Тихоокеанский регион	65% [54–78]	... [... – ...]	65% [54–78]
Карибский регион	69% [60–79]	39% [31–48]	68% [59–78]
Восточная и Южная Африка	83% [70–98]	64% [49–93]	83% [69–97]
Восточная Европа и Центральная Азия	51% [46–56]	... [... – ...]	51% [46–56]
Латинская Америка	72% [65–81]	39% [33–45]	72% [64–80]
Ближний Восток и Северная Африка	51% [44–60]	34% [29–40]	50% [43–59]
Западная и Центральная Африка	82% [72–95]	37% [29–45]	78% [69–90]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	76% [64–87]	... [... – ...]	76% [64–87]

Источник: Эпидемиологические оценочные данные ЮНЭЙДС 2023 г.